

กิจกรรมตรวจผู้สัมผัสโรคเรื้อน

กิจกรรม	ข้อบ่งชี้	วิธีปฏิบัติ	เป้าหมายต่อปี	ผู้รับผิดชอบ
1. ตรวจผู้สัมผัสโรค ร่วมบ้านกับผู้ป่วย (Household contact)	เมื่อมีผู้ป่วยใหม่และ ติดตามจนกว่าจะ พ้นระยะเฝ้าระวัง	นัดให้ผู้ป่วยพาผู้สัมผัสทุกคนที่ อยู่ในหลังคาเรือนเดียวกันมารับ การตรวจร่างกายเพื่อค้นหา อาการโรคเรื้อนโดย 1. ให้ผู้ป่วยแนะนำหรือพา ผู้สัมผัสมาตรวจในวันรับยาหรือ วันตรวจสถานะ 2. เมื่อออกเยี่ยมบ้านให้ตรวจ ร่างกายผู้สัมผัสโรคที่ยังไม่ได้รับ การตรวจด้วย	<ul style="list-style-type: none"> ■ 100% ของจำนวนผู้สัมผัส โรคร่วมบ้านผู้ป่วยในทะเบียน รักษา ได้รับการตรวจร่างกาย ปีละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยขึ้น ทะเบียนรักษา 	ผู้รับผิดชอบงานโรเรื้อน ของหน่วยคู้สัญญาของ บริการระดับปฐมภูมิ (contracting unit for primary care: CUP) ประสานให้ รพ.สต. ตรวจผู้สัมผัสโรคร่วม บ้านและรายงาน ตามลำดับ
2. สำรวจผู้สัมผัสโรค ที่อยู่รอบๆ บ้าน index case (neighboring contact)	ในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วย ใหม่ในปีนั้นๆ	1. ค้นหารายชื่อของผู้สัมผัสโรค ที่อยู่รอบๆ บ้าน index case ทั้งหมด 2. ตรวจร่างกาย neighboring contact โดย ผสมผสานกับโรคอื่นใน กิจกรรมการออกเยี่ยมบ้าน 3. ให้สุศึกษาว่าถ้ามีอาการ สงสัยให้รีบออกมารับการรักษา ที่สถานบริการสาธารณสุข	ทุกหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในปี นั้น ๆ ได้รับการสำรวจ 1 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบงาน โรเรื้อนของหน่วย คู้สัญญาของบริการ ระดับปฐมภูมิ (CUP)
3. สำรวจผู้สัมผัสโรค ที่เป็น social contact	Index case ที่เป็น ผู้ป่วย MB	1. ถาถามหา social contact จาก index case ว่านอกจาก คนในบ้านแล้วได้มีกิจกรรมหรือ มี ปฏิสัมพันธ์หรือมีการติดต่อ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งไม่ได้ อาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับ Index case อย่างน้อย 3 ชั่วโมง (ไม่จำเป็นต้อง ต่อเนื่องกัน) เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป มีใครบ้าง 2. ตรวจร่างกาย 3. ให้สุศึกษาว่าถ้ามีอาการ สงสัยให้รีบออกมารับการรักษา ที่สถานบริการสาธารณสุข	100% ของจำนวนผู้สัมผัสโรค ที่เป็น social contact ได้รับ การตรวจร่างกาย 1 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบงานโรค เรื้อนของหน่วยคู้สัญญา ของบริการระดับปฐมภูมิ (CUP)

นิยามของผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคเรื้อน (Close contact) ใน 3 กลุ่ม

1. **Household contact** คือ ผู้ที่อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับผู้ป่วยโรคเรื้อนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยสูตรยาผสมระยะสั้น (Multidrug Therapy : MDT) โดยผู้ที่มาอยู่อาศัยหลังผู้ป่วยกินยาแล้วไม่นับเป็นผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน

2. **Neighboring contact** คือ ผู้ที่พักอาศัยในบ้านรอบๆ บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อนในระยะรัศมี 20 เมตร เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยสูตรยาผสมระยะสั้น (Multidrug Therapy : MDT)

3. **Social contact** คือ ผู้ที่ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยโรคเรื้อนนานอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวัน (ไม่ต้องติดต่อกัน) เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยสูตรยาผสมระยะสั้น (Multidrug Therapy: MDT)